

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гинос®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата Гинос®

Группировочное название

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Лекарственная форма

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Гинкго двулопастного
листьев экстракт сухой, 40 мг
стандартизованный по
содержанию
гинкгофлавоногликозидов –
не менее 24 %

и терпенлактонов:

гинкголидов А, В и С – не менее 2,8 %

билобалидов – не менее 2,6 %

Вспомогательные вещества:

Лактозы моногидрат 122,5 мг

Крахмал кукурузный 65 мг

Повидон К-17 (поливинилпирролидон) 10 мг

Карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) 7,5 мг

Магния стеарат 2,5 мг

Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 2,5 мг

Вспомогательные вещества оболочки:

Опадрай II 10 мг

[Лактозы моногидрат 28,000 %

Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 34,000 %

Титана диоксид (Е 171)	22,350 %
Макрогол (полиэтиленгликоль 4000)	12,000 %
Краситель железа оксид красный (Е 172)	3,400 %
Краситель железа оксид черный (Е 172)]	0,250 %

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой красно-коричневого цвета. На поперечном разрезе видны два слоя. Внутренний слой светло-коричневого цвета с белыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

ангиопротекторное средство растительного происхождения

Код АТХ

N06DX02

Фармакологические свойства

Препарат способствует укреплению и повышению эластичности сосудистой стенки, улучшает реологические свойства крови и вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой. Препарат Гинос® обладает ангиопротекторными свойствами. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на уровне головного мозга, так и на периферии). Препарат нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Препятствует повышению фибринолитической активности крови. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует кровенаполнение сосудов. Препарат повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга.

Показания к применению

- Симптоматическое лечение когнитивных нарушений у взрослых (ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и интеллектуальных способностей)
- Вспомогательное лечение головокружений вестибулярного происхождения

- Симптоматическое лечение тиннитуса (звон или шум в ушах)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пониженная свертываемость крови, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, эрозивный гастрит, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет), дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, артериальная гипотензия.

С осторожностью: пациенты с эпилепсией.

Способ применения и дозы

При симптоматическом лечении когнитивных нарушений у взрослых, при головокружении вестибулярного происхождения и симптоматическом лечении тиннитуса: 3 таблетки в день, распределенные в течение дня.

Таблетки принимать внутрь, во время еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды (1/2 стакана).

Курс лечения составляет не менее 3 месяцев. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (покраснение кожи, кожная сыпь, отечность, зуд, крапивница), диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея), головная боль, головокружение, бессонница, нарушения слуха, снижение свертываемости крови. В случае возникновения вышеуказанных побочных реакций, в том числе, не указанных в инструкции, прием препарата следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется применение препарата Гинос® пациентам, постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту и антикоагулянты (прямого и непрямого действия), тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты, противосудорожные препараты, гентамицин. Не рекомендуется одновременное применение препаратов гинкго билоба с

эфафирензом, так как возможно снижение его концентрации в плазме крови вследствие индукции цитохрома СYP3A4 под влиянием гинкго билоба.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Улучшение состояния обычно проявляется через 1 месяц после начала лечения.

При внезапном снижении слуха или потере слуха следует немедленно обратиться за врачебной помощью. Консультация врача также необходима при частом головокружении и шуме в ушах. Не рекомендуется принимать препарат Гинос® вместе с алкогольными напитками.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 таблеток в банку из полимерных материалов.

Каждую банку или 3 или 9 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет. Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая,
д. 14.

Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71.