

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### ИРУНИН®

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Ирунин®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** итраконазол

**Лекарственная форма:** таблетки вагинальные

### Состав на одну таблетку

*Действующее вещество:*

Итраконазол 200,0 мг

*Вспомогательные вещества:*

Лактозы моногидрат 506,6 мг

Крахмал картофельный 303,7 мг

Натрия лаурилсульфат 2,2 мг

Повидон (поливинилпирролидон) 54,5 мг

Тальк 22,0 мг

Магния стеарат 11,0 мг

### Описание:

Таблетки белого или почти белого цвета в форме кольца.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковое средство

**Код АТХ:** [J02AC02]

### Фармакологические свойства

*Фармакодинамика*

Итраконазол – производное триазола. Синтетическое противогрибковое средство широкого спектра действия. Нарушает синтез эргостерола, являющегося важным компонентом клеточной мембраны грибов. Активен в отношении инфекций, вызываемых дрожжеподобными грибами и дрожжами: *Candida* spp. включая *C. albicans*, *C. glabrata* и *C. krusei* и пр.

### *Фармакокинетика*

При интравагинальном введении создается эффективная местная концентрация интраконазола. Системная абсорбция минимальна.

### **Показания к применению**

Местное лечение вульвовагинального кандидоза (в т.ч. рецидивирующего).

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к интраконазолу и другим компонентам препарата; беременность (I триместр).

*С осторожностью:* беременность II и III триместр (препарат можно применять только в том случае, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода; период лактации (при необходимости назначения итраконазола грудное вскармливание следует прекратить).

### **Способ применения и дозы**

Интравагинально. Вагинальные таблетки вводят во влагалище однократно вечером перед сном, в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах. Курс лечения 7-14 дней. Повторный курс лечения возможен после консультации с врачом.

### **Побочное действие**

Редко – зуд, ощущение жжения во влагалище, кожная сыпь в области наружных половых органов, не требующие отмены препарата.

### **Передозировка**

Применение препарата в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни.

В случае непредусмотренного применения препарата (внутрь) необходимо провести промывание желудка и назначить внутрь активированный уголь. Специфического антидота нет

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не установлено.

### **Особые указания**

Для предотвращения реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров.

В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

Для предотвращения реинфекции следует соблюдать правила гигиены.

Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, следует провести повторное микробиологическое исследование с целью подтверждения диагноза.

При возникновении аллергической реакции лечение следует прекратить. При необходимости препарат может быть удален путем промывания влагалища кипяченой водой.

### **Влияние на способность управления транспортными средствами**

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций (управление автомобилем и пр.).

### **Форма выпуска**

Таблетки вагинальные, 200 мг.

По 1 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 контурную ячейковую упаковку по 1 или 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту

**Производитель:** АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.3.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая,  
д. 14.

Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71.